

SUIVI FONGE - PLAINE D'ARGENSON (79) La Corciale

Hypholome en touffe © SMMA

Quand

11 novembre 2025



Qui



Méthode

Identification des zones propices à la pousse des champignons notamment les lieux humides avec des matières mortes comme le bois.

Résultats

La dégradation lente de bois mort au sol favorise le développement de la **fonge saprotrophe**. On peut noter par exemple:

- ***Gymnopilus penetrans***, déjà très présent les années précédentes qui continue de se développer
- ***Pholiotina arrheni*** et ***Helvella crispa***, présents en faible quantité l'année dernière, qui ont connu une forte expansion

Gymnopile pénétrant (*Gymnopilus penetrans*)



Gymnopilus penetrans © SMMA

Concocybe annelé (*Pholiotina arrheni*)



Pholiotina arrheni © SMMA

Helvelle crépue (*Helvella crispa*)



Helvella crispa © SMMA

La lépiote de Josserand, nouvellement installée à La Corciale

Lépiote de josserand (*Lepiota subincarnata*)



Lepiota subincarnata © SMMA

La **lépiote de josserand** (*Lepiota subincarnata*) a été observée pour la première fois à la Corciale. Il s'agit d'une petite lépiote reconnaissable à sa teinte rose pale à rougeâtre, qui pousse en groupe sur les litières en décomposition, dont elle se nourrit. On la trouve principalement dans les haies et les jardins: sa présence ici est favorisée par l'absence de végétation arbustive qui étoufferait le sol.

Ne vous fiez pas à son **odeur de mandarine**: elle contient des **amatoxines** qui causent sa **forte toxicité** !

Source: Fungal portrait, G Kibby

Suivez l'évolution du vivant grâce à la photothèque de
Plaine d'Argenson

