

SUIVI AMPHIBIEN - JAURE (24)

2 mars 2026

Bois de l'Espèr

Rainette méridionale © Créateur de Forêt

Quand

Le 3 juin 2025

Qui



Méthode

Les zones favorables à la présence d'amphibiens ont été prospectées la nuit à l'aide d'une lampe pour repérer les individus

Résultats

Seules deux espèces ont été observées au niveau de la mare : la **Rainette méridionale** et la **Grenouille verte**, ce dernier groupe rassemblant en réalité plusieurs espèces difficiles à déterminer sans manipulation. La forte population de grenouilles vertes — avec plus d'une cinquantaine d'individus matures — pourrait correspondre à des Grenouilles rieuses ou communes.

Aucune espèce de triton n'a pu être détectée lors de la première prospection en raison d'une végétation très dense et d'une eau trouble. Cependant, en ce début d'année 2026, des larves de Salamandre tachetée ainsi que des tritons en parade nuptiale ont déjà été observés, confirmant leur présence sur le site.

La Rainette méridionale



Très proche parente de la Rainette verte, la **Rainette méridionale** (*Hyla meridionalis*) s'en distingue par un chant plus lent et par une bande latérale sombre qui souligne l'œil mais ne se prolonge pas sur les flancs. Présente dans la péninsule

ibérique, le sud et l'ouest méditerranéen de la France jusqu'en Vendée, elle fréquente les mares, étangs, buissons, arbustes, ainsi que les jardins et abords d'habitations.

Les rainettes méridionales atteignent leur maturité sexuelle vers 3 à 4 ans. En mai, les mâles gagnent les points d'eau en premier pour émettre leurs chants, produits par vagues et audibles à grande distance. Les œufs, déposés en paquets qui tombent au fond de l'eau, éclosent 12 à 15 jours plus tard pour donner des larves de 15 à 18 mm. Celles-ci complètent leur métamorphose environ trois mois plus tard.

L'espèce se nourrit principalement d'insectes, d'araignées, de cloportes et de myriapodes.

De octobre à mars, elle hiverné dans la vase ou sous la litière de feuilles.

La Grenouille verte

La **Grenouille verte** (*Pelophylax kl. esculentus*) est une espèce issue de l'hybridation entre deux grenouilles vertes européennes : la Petite grenouille verte et la Grenouille rieuse. On la rencontre dans la majeure

partie de l'Europe, à l'exception de l'Angleterre et de la péninsule Ibérique, où elle est remplacée par la Grenouille de Pérez. Elle fréquente les grandes mares, les étangs, les marais, ainsi que les lacs et les rivières.

La reproduction a lieu entre avril et mai. Chaque femelle pond environ 6 000 à 10 000 œufs, qui tombent au fond de l'eau. Une semaine plus tard, ces œufs donnent naissance à des larves. La métamorphose s'achève au bout de 3 à 4 mois, donnant un jeune individu de 8 à 12 cm, dont l'espérance de vie moyenne est de 5 à 6 ans.

Elles hibernent durant les quatre mois d'hiver, enfouies dans la vase au fond des mares, ruisseaux ou étangs. Pour survivre, elles ralentissent fortement leur métabolisme et utilisent les réserves d'énergie accumulées pendant l'été et l'automne.

